

RTG KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO i MIEDNICY

Należy zabrać ze sobą skierowanie na badanie.

Należy w dniu badania dostarczyć poprzednio wykonywane badania wraz z opisem (RTG/TK/MR) jeżeli były wykonywane Zakładem Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

Przygotowanie do badania:

Na 2 dni przed badaniem proszę stosować dietę lekkostrawną, bez napojów gazowanych, bez produktów wzdymających. W tym czasie najlepiej sprawdzą się pokarmy płynne lub półpłynne.

W dniu poprzedzającym badanie należy przyjmować preparat symetykonu (dostępny w aptece bez recepty, np. Espumisan, Simetic, Spumax, Symetykon, Ulgasim, Ulgix), zadbać o wypróżnienie i wypić 2–3 l wody niegazowanej.

Konieczne może być wykonanie lewatywy w dniu poprzedzającym badanie.

Na badanie proszę zgłosić się całkowicie na czczo (nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu).

W dniu badania, stosowane stale leki należy przyjąć według zaleceń, popijając niewielką ilością wody niegazowanej, jednak nie później niż 2 godziny przed badaniem.

Karmienie piersią nie stanowi przeciwwskazania do wykonania badań z użyciem promieniowania rentgenowskiego, a ekspozycja na promienie RTG w dawce diagnostycznej nie zmienia składu mleka, nie powoduje też jego radioaktywności, dlatego kobieta może karmić piersią bezpośrednio po przeprowadzeniu badania.