

RTG SKOPIA KONTRASTOWA PRZĘŁYKU

Należy zabrać ze sobą skierowanie na badanie.

Przygotowanie do badania:

W dniu poprzedzającym badanie ostatni posiłek proszę spożyć do godziny 18:00, później można pić jedynie wodę niegazowaną.

W dniu badania proszę pozostać całkowicie na czczo (nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu) do czasu badania.

W dniu badania, stosowane stale leki należy przyjąć według zaleceń, popijając niewielką ilością wody niegazowanej, jednak nie później niż 2 godziny przed badaniem.

Karmienie piersią nie stanowi przeciwwskazania do wykonania badań z użyciem promieniowania rentgenowskiego, a ekspozycja na promienie RTG w dawce diagnostycznej nie zmienia składu mleka, nie powoduje też jego radioaktywności, dlatego kobieta może karmić piersią bezpośrednio po przeprowadzeniu badania. Do badania radiologicznego górnego odcinka przewodu pokarmowego stosuje się doustnie zawiesinę siarczanu baru (baryt), który nie rozpuszcza się w wodzie i nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie przenika do mleka matki, a co za tym idzie – nie ma wpływu na organizm dziecka karmionego piersią.